

Jól vizsgázott a Stellar a Várongi Agro-Tur 99 Kft.-nél

A 2010-es év újdonsága a kukorica gyomirtásában a **Stellar**. A készítmény két hatóanyagának köszönhetően széles hatásspektrummal rendelkezik, így tovább bővül az érzékeny fajok listája, gyommentességet biztosítva a kukoricatábláinkon.

A Stellarral kapcsolatos tapasztalatairól beszélgettem Zemán Zoltánnal, a Várongi Agro-Tur 99 Kft. növénytermesztési ágazatvezetőjével.

Kérlek, mutasd be a gazdaságot!

Dombóvártól 20 km-re, Várongon található a központunk. Közel ezer hektáron gazdálkodunk, 500 ha-on kukoricát termesztünk, 200 ha-on található napraforgó, 250 ha-on őszi búza és 50 ha-on cukorrépa. Ahogy a vetésforgóból is látszik, az egyik legfontosabb növényünk a kukorica, melynek termesztését alapvetően meghatározza a gyomirtás sikeressége.

Milyen gyomnövények találhatóak a területeiken?

A legnagyobb problémát az egyszikűek közül a köles és a muharfélék jelentik, míg a kétszikűek közül a csattanó maszlag, a parlagfű, a libatopfélék okoznak jelentős problémát kukoricavetéseinkben. Az évelők közül egyre több táblában a mezei acattal gyűlik meg rendszeresen a bajunk, amely alapvetően meghatározza az alkalmazható készítmények sorát.

Milyen tapasztalataitok voltak a Stellar használatával?

A tavalyi évben 10 ha-on próbálhattuk ki a **Stellart**, amit egy kukorica-fajtasorra helyeztünk ki. Ezen a táblán a fent említett gyomnövények mindegyike megtalálható volt. Ráadásul ennek a területnek a gyomirtását a végére hagytuk. A kijuttatást egyhetes esős időszak

is késleltette, így az ott található gyomnövények jócskán megerősödtek, sok esetben már majdnem térdig értek. Ez azonban nem volt probléma a **Stellarnak**, látványosan és gyorsan pusztította el őket. Az egyszikű gyomnövények kifehéredtek, majd elszáradtak, míg a kétszikűek és az évelők egyrészt kifehéredtek, másrészt tekeredve-deformálódva elpusztultak. A mezei acat ellen a **Stellar** kiváló hatást adott, és újrachajtást sem tapasztaltunk.

Megfigyeltetek valamilyen fitotoxikus hatást a hibrideknél?

Közel 90 féle különböző hibrid került elvetésre a területen, de nem találtunk semmilyen károsítást sem. Erre azt hiszem jó bizonyíték, hogy a kukorica-termésátlagok 11 és 13 t/ha között alakultak.

Használni fogjátok a Stellart a jövőben?

Természetesen igen, mivel extrém körülmények (késői gyomirtás, megerősödött gyomnövények) között is kiváló gyomirtást adott. Az évelő, valamint a magról kelő gyomnövényekkel erősen borított területen kevés készítmény alkalmazható ilyen eredményességgel.

A beszélgetést lejegyezte
Ádámszki Tamás
fejlesztőmérnök